Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Vacunación Coqueluche a Niños de 8º Básico

Este martes 27 de agosto se lanzó a nivel país la vacunación contra Coqueluche o Tos Convulsiva para **todos los jóvenes de 8º Básico,** grupo que este año se incorpora dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Si bien la vacuna se coloca hoy a los niños a los 2, 4, 6 y 18 meses y posteriormente un refuerzo a los seis años, se estima que su inmunidad puede durar 10 años después de recibida la última dosis. Por lo tanto, los adolescentes pierden la protección que adquirieron durante su infancia.

El coqueluche es una infección bacteriana aguda que afecta al tracto respiratorio y ataca principalmente a los niños. Desde el 2010 se ha visto un aumento de casos en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. En Chile se vio un aumento en el número de casos en 2012, el cual afectó en mayor medida a las regiones de: Biobío, Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

Ante esta situación, las autoridades de salud, bajo la recomendación del Comité Asesor de Vacunas y Estrategia de Inmunización (CAVEI), implementó una estrategia de vacunación en capullo, es decir, por etapas y focalizada en las regiones que presentaron las mayores tasas de contagio.

En esas regiones, Biobío, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Los Lagos se vacunó a todas las mujeres con hijos recién nacidos (en las maternidades), así como a su entorno familiar: padre, abuelos y hermanos. La decisión se fundamentó en que la población más vulnerable a la bacteria eran los niños menores de un año.

Luego se avanzó a una segunda etapa: vacunar a los adolescentes de 8º Básico de esas mismas regiones, quienes son fuente de contagio para los más pequeños, que aún no han recibido su vacuna o que no han completado el esquema de inmunización.
Esto implicó una baja significativa en el número de casos en esas regiones. El año pasado hubo 5.754 casos de coqueluche (incidencia 24,3 por 100 mil hab.), con 13 fallecidos. Este año la cifra de contagios ha bajado a 1.050 notificados (con una incidencia 6/100 mil a la fecha), sin ninguna defunción.

Dados estos resultados, la estrategia del Gobierno es ampliar esta vacunación a todos los adolescentes de 13 años del país, incorporando esta vacuna dentro del Programa Nacional de Inmunización, lo cual se está haciendo a partir de hoy.

Con ello se vacunará a 250 mil jóvenes de 13 años de todo el país. La vacunación es gratuita y se realizará en los establecimientos educacionales públicos, subvencionados y privados. El proceso estará a cargo de los servicios de salud y establecimientos de salud municipales.

LA ENFERMEDAD

El coqueluche o tos ferina es una enfermedad infecto-contagiosa transmitida por la bacteria *Bordetella pertussis*.

Sus síntomas son:

- Tos incontrolable o ataques de tos
- Silbido en el pecho que se produce al inspirar después de toser
- Vómitos, debido al esfuerzo producido al toser

Se contagia por contacto directo de persona a persona, mediante las gotitas de secreciones respiratorias del individuo infectado. Su período de incubación (lapso entre el contagio y los síntomas) es de 7 a 10 días.