





INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2

División Prevención y Control de Enfermedades
Departamento de Inmunizaciones
Subsecretaría de Salud Pública

Abril de 2021



INFORMACIÓN TÉCNICA VACUNAS CONTRA SARS-COV-2

Nombre comercial	BNT162b2	CoronaVac	ChAdOx1-S	Convidecia o Ad5-nCoV
Laboratorio	Pfizer-BioNTech	Sinovac	AstraZeneca	Cansino
Imagen				
Indicación	A partir de los 16 años	A partir de los 18 años	A partir de los 18 años	A partir de los 18 años
Esquema	2 dosis : 0 y 28 días	2 dosis : 0 y 28 días	2 dosis : 0 y 28 días	1 dosis
Dosis	0,3 mL	0,5 mL	0,5 mL	0,5 mL
Forma farmacéutica	Suspensión inyectable en vial multidosis (5 dosis)	Suspensión inyectable en vial monodosis	Suspensión inyectable en vial multidosis: presentación de 10 dosis (5mL) o 8 dosis (4 mL)	Suspensión inyectable en vial multidosis o monodosis o jeringa prellenada
Técnica de preparación	Diluir la vacuna con 1,8 ml de cloruro de sodio al 0,9% Limpiar el tapón del vial de la vacuna con antiséptico, durante la dilución y preparación.	Extracción de la totalidad del contenido del vial	Extraer del vial multidosis, la dosis indicada (0,5 mL)	Extraer del vial multidosis, la dosis indicada (0,5 mL)
Duración frasco abierto	6 horas desde su dilución	La vacuna debe ser administrada inmediatamente después de abierta	6 horas desde su apertura	La vacuna debe ser administrada inmediatamente después de abierta
Apariencia	Suspensión de color blanquecino	Suspensión opalescente o blanco lechoso	Suspensión clara a ligeramente opaca, incolora a ligeramente marrón	Sin antecedentes
Vía de administración	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular	Intramuscular
Almacenamiento	Almacenar entre -90 a -60°C a nivel central y para su administración a nivel ejecutor, conservar en temperaturas entre 2 a 8 °C por 5 días	Mantener entre 2° a 8°C. No congelar. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz	Mantener entre 2° a 8°C. No congelar. Almacenar en el empaque original para protegerlo de la luz	Mantener en temperatura entre 2° a 8°C.
Contraindicación	Antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave (ej., anafilaxia) a algún componente de la vacuna	Antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna	Antecedentes conocidos de reacción alérgica grave (ej., anafilaxia) a cualquier componente de esta vacuna	Antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna

