DEIS
Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

INFORME SEMANAL DE DEFUNCIONES POR COVID19 N°50

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
Ministerio de Salud

27 de mayo de 2021

Resumen Ejecutivo

Este informe entrega información actualizada de las Defunciones ocurridas en Chile, en base a datos disponibles hasta el jueves, 27 de mayo de 2021 17:46:09

Total de defunciones acumuladas **180.734.** Para el año 2020 **125.832** y para el año 2021 **54.902**
Total de defunciones por Covid-19 acumuladas **37.244** . Año 2020 **22.213**; año 2021 **15.031**
Total de defunciones por Covid-19 Confirmado acumuladas **29.047 .** Año 2020 **16.825 ;** año 2021 **12.222**
Total de defunciones por Covid-19 Sospechoso acumuladas **8.197**. Año 2020 **5.388** ; año 2021 **2.809**

Las defunciones acumuladas ocurridas entre marzo 2020 y enero 2021 por Covid-19, Confirmado y Sospechoso, representan el **20,61%** del total de defunciones del país, de acuerdo a las observaciones y recomendaciones de la OMS/OPS para la codificación de las defunciones producto del Covid-19.

En las últimas dos semanas se ha registrado un total de **1604** defunciones por Covid-19 Total, con una tasa ajustada del **5,2** por 100.000 habitantes a nivel país.

Índice

Tabla de contenido	Página
Introducción	2
Proceso de Codificación de la Causa Básica de Defunción (CBD)	2
Proceso Búsqueda Intencionada de Defunciones por Covid19	3
Distribución de defunciones por todas las causas. Comparación de los últimos 5 años	7
Análisis de exceso de mortalidad por grupos etarios, según mes de defunción (tasa por cien mil habitantes)	8
Principales causas de muerte en Chile, año 2020	10
Perfil etario y sexo de los fallecidos por Covid19	13
Lugar de defunción de los fallecidos por Covid19 y otras causas	14
Resultados Defunciones y Mortalidad por Covid19	15
Simulación perfil de fallecidos por Covid19, cuando no se considera Covid19 como Causa de Muerte	18
Defunciones y Mortalidad por Covid19 en las últimas dos semanas en Chile	20
Notas técnicas y aclaratorias	23
Bibliografía	23

Introducción

El Sistema de Estadísticas Vitales en Chile es continuo, obligatorio y centralizado. Se encuentra organizado bajo el marco de un acuerdo interinstitucional respaldado por un convenio tripartito que data del año 1982, actualizado con el Decreto N°68 del año 2012 y la ADENDA del 2018. Conformado por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Salud a través del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Proceso Codificación de la Causa Básica de Defunción (CBD)

El proceso comienza cuando una persona fallece y se debe generar el Certificado Médico de Defunción (CMD), siendo un formulario oficial, impreso y distribuido a los establecimientos de salud por el SRCeI, instrumento público que contiene datos sensibles, sujeto a las disposiciones legales que regulan tal información.

La base de datos de defunciones, se construye con los CMD, los cuales son sometida a un riguroso proceso de validación, para garantizar la confiablidad y la validez de la información.

Periódicamente, el SRCeI envía al DEIS los Certificados Médicos de Defunción inscritos y transcritos en formato electrónico. Estos son procesados por el DEIS en primera instancia para estandarizar los términos clínicos y homologarlos para su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10). Luego, se aplican las reglas de clasificación establecidas en la CIE10 que permiten determinar la causa básica y causa múltiples de la defunción.

Producto de la pandemia, el DEIS ha implementado desde marzo todas las observaciones y recomendaciones de la OMS/OPS para la codificación de defunciones producto del Covid19. Es así como se incorporaron los nuevos códigos para su codificación:

U07.1 COVID-19, virus identificado
- Caso confirmado con resultado positivo de la prueba.

U07.2 COVID-19, virus no identificado
- Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19
- Caso probable de COVID-19
- Caso sospechoso de COVID-19

Proceso Búsqueda Intencionada de Defunciones por Covid19

Con el inicio de la pandemia el Departamento de Estadísticas e Información de Salud implementó un plan de búsqueda intencionada de defunciones por Covid19. El plan en proceso de mejora continua estableció:

a) Dar prioridad a la codificación de todas las defunciones atribuibles a causas respiratorias o Covid19.

b) Identificar y establecer las fuentes externas. Es así como desde marzo se gestionó el acceso a las bases de datos de Epivigila, Unidad de Gestión de Camas Críticas - UGCC. Esta última para validar ciertas situaciones especiales.

c) Fomentar la realización del curso Curso Correcto llenado del Certificado Médico de Defunción

d) Implementación de procesos de seguimiento, validación y recodificación para todas las defunciones de casos Covid19 - Sospechosos, Causas Respiratorias u Otras Causas, que posteriormente contaron con la confirmación de un examen PCR. En términos generales, las principales reglas son:

Codificación de causa básica solo con Certificado Médico de Defunción		Mejora especificidad de las defunciones al utilizar fuente externa
Covid19 – Sospechoso o probable	->	"Covid19 – Confirmado" al disponer de un PCR Positivo
Covid19 – Confirmada	->	"Covid19 – Sospechoso o probable", al disponer de un PCR Negativo
Enfermedad Respiratoria	->	"Covid19 – Confirmado" al disponer de un PCR Positivo
Alguna enfermedad respiratoria u otras causas (se excluyen causas externas o materna)	->	"Covid19 – Sospechoso" al estar catalogado como caso "Probable" en Epivigila

"El uso de fuentes externas y una posible recodificación mejoran la especificidad de la causa de defunción"

La información que entrega la **base de consolidación de Laboratorios** , ayuda a precisar y confirmar lo consignado por el médico en el CMD, esto debido a que no todos especifican el Covid19 como causa de muerte, así como también existen certificados que tienen la causa Covid19 consignada, pero no cuentan con un examen PCR confirmatorio.

La información que entrega la **base de Epivigila** , aporta entre otras cosas, con la identificación de casos a los cuales no se les ha realizado examen de PCR, pero que se han notificado como un caso probable.

Dado este proceso, se puede identificar que al recepcionar el CMD se obtiene que, del total de defunciones, el 1% consigna en su certificado Covid19 Confirmado, el 13% menciona una posible causa por Covid19 y el 9% con alguna causa respiratoria.

Posterior a esta etapa inicial de codificación, validación y especificación con las fuentes de datos anteriormente señaladas, las defunciones por Covid19 confirmado se elevan al 16% del total de muertes del país, las defunciones por sospecha de Covid19 disminuyen al 5% al igual que las causas respiratorias (8%).

Codificación Inicial



Codificación Final



La codificación de la causa básica de defunción del grupo Covid19 (Sospechoso o Confirmado) varía conforme se actualice el estado clínico (Confirmado, Sospechoso o Descartado) en Epivigila o bien el resultado del examen de Laboratorio (Positivo, Negativo o No concluyente). Es importante recalcar que la fuente oficial, que confirma un Covid19 es el resultado de Laboratorio.

El 70,4% de la pesquisa de defunciones por sospecha de Covid19, proviene del CMD informado con Covid19, pero con PCR Negativo, no concluyente o sin registro de examen realizado en Laboratorio. El 29,6% restante, son pesquisados sin identificación de Covid19 en el CMD, pero que presentan un examen de laboratorio no concluyente, sin resultado o bien sin registro en laboratorio, pero presente en la base de Epivigila con registro de etapa clínica Confirmada, Sospechosa o Probable.

Para los casos confirmados, la pesquisa sin CMD equivale al 22,7% ; el 77,3% restante viene con información en el documento oficial.

El proceso completo y la reclasificación de la causa básica de defunción basado en el proceso BIRD COVID-19, se ve reflejada en el gráfico a continuación. En donde cada etapa del proceso se visualiza de arriba hacia abajo. Cada color mantiene la trayectoria de la codificación inicial a la final, viendose afectada por el cruce de las fuentes de datos de Laboratorio y Epivigila. Esta representación gráfica, resume el movimiento de codificaciones durante la última semana. Las etapas del proceso, están representadas a la derecha del gráfico.

Resultado tras aplicar el proceso de búsqueda intencionada y reclasificación de defunciones por COVID-19



La aplicación de la metodología BIRD COVID-19, genera un movimiento en la codificación de la causa básica de muerte, ya que depende de la confirmación o descarte de PCR dada por laboratorio.

La reclasificación de la causa de defunción posterior al proceso BIRD de la última semana analizada se puede analizar en la tabla a continuación. En donde se observa que 933 fueron reclasificados y distribuídos en distintas casuas de defunción.

Tabla resumen codificación inicial (CMD) y codificación final (CBD)

CBD ▲	Total	Causas Externas y Causas Maternas	COVID Confirmado	COVID Sospechoso	Respiratorias
CMD ▲	casos	casos	casos	casos	casos
Total	**933**	**83**	**498**	**231**	**121**
Causas Externas y Causas Maternas	**83**	83	—	—	—
COVID Confirmado	**42**	—	35	7	—
COVID Sospechoso	**369**	—	277	92	—
Otras	**261**	—	157	104	—
Respiratorias	**178**	—	29	28	121

Distribución de defunciones por todas las causas. Comparación mortalidad promedio por mes años 2016-2019, en relación a años 2020 y 2021

Comparación mortalidad promedio 2016-2019 y mortalidad 2020 y mortalidad 2021, según mes de defunción. Todas las causas



Al realizar una comparación de las defunciones registradas e informadas en los últimos 6 años en Chile (2016-2021), agrupando el cuatrienio 2016-2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en todos los meses analizados.

Defunciones por mes y año

. ▲	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Año defunción ▼	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**
2021	**54.920**	11.193	10.239	11.836	11.950	9.702	—	—	—	—	—	—
2020	**125.940**	9.052	7.944	8.701	8.896	12.003	16.082	12.594	11.081	10.211	10.320	9.371
2019	**110.388**	8.526	7.857	8.248	8.614	9.889	10.455	10.704	9.980	9.567	9.300	8.599
2018	**106.820**	8.136	7.373	8.221	8.212	8.887	9.983	10.519	10.500	9.262	8.922	8.359
2017	**106.448**	8.705	7.437	7.773	8.185	9.121	10.828	10.496	9.700	9.289	8.735	8.074
2016	**104.062**	8.402	7.444	7.810	8.123	8.748	9.443	10.734	9.697	9.245	8.557	7.982

Análisis de exceso de mortalidad por grupos etarios, según mes de defunción (tasa por cien mil habitantes)

Comparación 0 a 29 años



Grupo_etario ▲	0 a 29	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-4%	-15%
Febrero	-5%	-6%
Marzo	-9%	-0%
Abril	-15%	-13%
Mayo	-4%	-32%
Junio	-5%	.
Julio	-16%	.
Agosto	-24%	.
Septiembre	-13%	.
Octubre	-9%	.
Noviembre	-14%	.

Comparación 30 a 49 años



Grupo_etario ▲	30 a 49	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-9%	6%
Febrero	-8%	13%
Marzo	-0%	31%
Abril	-2%	27%
Mayo	23%	2%
Junio	37%	.
Julio	15%	.
Agosto	1%	.
Septiembre	2%	.
Octubre	15%	.
Noviembre	-1%	.
Diciembre	-1%	.

Comparación 50 a 59 años



Grupo_etario ▲	50 a 59	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-3%	23%
Febrero	2%	24%
Marzo	-1%	37%
Abril	7%	63%
Mayo	28%	16%
Junio	57%	.
Julio	18%	.
Agosto	16%	.
Septiembre	7%	.
Octubre	19%	.
Noviembre	7%	.
Diciembre	9%	.

El cálculo de la variación porcentual se realiza en base a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019. Los valores negativos, indican que en el mes observado, las defunciones son menores a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019; mientras que, un valor positivo indica el porcentaje de sobremortalidad.

Comparación 60 a 69 años



Grupo_etario ▲	60 a 69	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-0%	24%
Febrero	-3%	27%
Marzo	5%	43%
Abril	-4%	42%
Mayo	27%	2%
Junio	70%	.
Julio	22%	.
Agosto	6%	.
Septiembre	3%	.
Octubre	13%	.
Noviembre	9%	.
Diciembre	13%	.

Comparación 70 a 79 años



Grupo_etario ▲	70 a 79	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-4%	23%
Febrero	-3%	21%
Marzo	-4%	30%
Abril	-1%	29%
Mayo	27%	-9%
Junio	57%	.
Julio	14%	.
Agosto	6%	.
Septiembre	2%	.
Octubre	6%	.
Noviembre	8%	.
Diciembre	12%	.

Comparación 80 y más años



Grupo_etario ▲	80 +	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-5%	10%
Febrero	-9%	15%
Marzo	-5%	21%
Abril	-7%	12%
Mayo	7%	-16%
Junio	24%	.
Julio	-5%	.
Agosto	-8%	.
Septiembre	-8%	.
Octubre	-4%	.
Noviembre	-4%	.
Diciembre	0%	.

El cálculo de la variación porcentual se realiza en base a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019. Los valores negativos, indican que en el mes observado, las defunciones son menores a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019; mientras que, un valor positivo indica el porcentaje de sobremortalidad.

Principales causas de muerte en Chile, años 2020 y 2021

Una Clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de datos de morbilidad y mortalidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes épocas. (Vol 02, CIE 10)
Los capítulos de la CIE10 agrupan causas asociadas que van generando mayor especificidad a la clasificación. Es importante considerar que existen criterios para la elaboración de las listas de principales causas de muerte siendo los más importantes su relación con la CIE-10, criterios epidemiológicos, importancia en salud pública y el uso específico de la lista. En este caso, se utiliza la agrupación de capítulo para el gráfico de torta; para el caso del ranking de las principales causas, se utiliza la lista 6/67 de OPS.
(https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9176:2013-listas-especiales-tabulacion-mortalidad&Itemid=40350&lang=es)

Distribución Causa Básica de Defunción por Capítulos CIE-10



Primeras 10 causas de muerte en Chile según frecuencia de defunciones



De acuerdo al comportamiento de la pandemia, se hace indispensable conocer la distribución de causas según tipo de COVID19 (Confirmado y Sospechoso). El gráfico siguiente, muestra como en los ú ltimos días informados, la causa de muerte por Covid19 Sospechoso es igual o mayor a Covid19 Confirmado. Este comportamiento se invierte con el correr de los días y la actualización de los registros de casos sospechosos a confirmados o de sospechoso a caso descartado en base a las fuentes externas (Laboratorio y Epivigila) que aportan en la reclasificación de los casos.

Defunciones por COVID19 (Sospechoso y Confirmado)



El proceso de Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Defunciones por COVID19, permite identificar y reclasificar la causa básica de defunción de acuerdo a la actualización de las fuentes utilizadas en el proceso; tal es el caso de Laboratorio y Epivigila (ambas administradas por el Departamento de Epidemiología de este Ministerio de Salud), fuentes externas al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, que entregan información de gran valor para la especificidad de la causa que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la persona a la muerte.

Total de fallecimientos por COVID19 Total según fecha de defunción y nuevas cargas



Total de fallecimientos por COVID19 Confirmado según fecha de defunción y nuevas cargas



Total de fallecimientos por COVID19 Sospechoso según fecha de defunción y nuevas cargas



Perfil etario y sexo de los fallecidos por COVID19 acumulado años 2020 y 2021

Distribución etaria según tipo de COVID19



Distribución según sexo de COVID19 Confirmado



Distribución según sexo de COVID19 Sospechoso



Distribución de defunciones por COVID19 Confirmado, según edad y sexo



Distribución de defunciones por COVID19 Sospechoso, según edad y sexo



Lugar de defunción de los fallecidos por COVID19 y otras causas acumulado años 2020 y 2021

Defunciones por COVID19 según lugar de defunción y otras causas de muerte



Defunciones por COVID19 según edad y lugar de defunción



Hombres



Mujeres



Resultados Defunciones y Mortalidad por COVID19 según año

El total de defunciones y la mortalidad por Covid19 (Sospechoso y Confirmado) por región de residencia se presenta por **Tasas Observadas por cien mil habitantes con Población INE, Censo 2017** ; y **Tasas ajustadas por edad y sexo por cada cien mil habitantes con Población Estándar INE, Censo 2002** .

Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	22.213	114,2	71,3
De Arica y Parinacota	288	114,2	77,0
De Tarapacá	351	91,7	80,5
De Antofagasta	781	112,9	103,8
De Atacama	150	47,7	32,3
De Coquimbo	425	50,8	29,9
De Valparaíso	1.845	94,1	49,4
Metropolitana de Santiago	13.927	171,4	116,5
Del Libertador B. O'Higgins	884	89,2	51,1
Del Maule	776	68,6	39,1
De Ñuble	290	56,7	28,0
Del Biobío	1.046	62,9	37,1
De La Araucanía	546	53,8	29,4
De Los Ríos	147	36,2	19,9
De Los Lagos	432	48,5	29,6
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	23	21,4	14,7
De Magallanes y de La Antártica Chilena	301	168,8	100,9
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID Total, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	15.031	76,4	47,5
De Arica y Parinacota	261	102,2	68,6
De Tarapacá	412	105,3	92,2
De Antofagasta	509	72,3	65,6
De Atacama	154	48,6	33,0
De Coquimbo	494	58,2	33,0
De Valparaíso	1.626	82,1	44,3
Metropolitana de Santiago	5.658	68,6	46,5
Del Libertador B. O'Higgins	701	70,0	40,2
Del Maule	951	83,2	47,8
De Ñuble	344	66,9	32,4
Del Biobío	1.497	89,6	52,5
De La Araucanía	892	87,5	48,8
De Los Ríos	408	100,0	53,3
De Los Lagos	899	100,2	59,5
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	31	28,8	20,6
De Magallanes y de La Antártica Chilena	193	107,3	63,4
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Total, ajustada por edad y sexo, segú n región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	37.244	190,3	118,4
De Arica y Parinacota	549	216,4	145,3
De Tarapacá	763	197,2	172,8
De Antofagasta	1.290	184,9	168,8
De Atacama	304	96,3	65,3
De Coquimbo	919	109,1	63,0
De Valparaíso	3.471	176,2	93,5
Metropolitana de Santiago	19.585	239,3	161,8
Del Libertador B. O'Higgins	1.585	159,1	91,1
Del Maule	1.727	151,8	86,9
De Ñuble	634	123,6	60,4
Del Biobío	2.543	152,5	89,8
De La Araucanía	1.438	141,4	78,4
De Los Ríos	555	136,4	73,7
De Los Lagos	1.331	148,8	89,6
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	54	50,2	35,4
De Magallanes y de La Antártica Chilena	494	275,7	163,9
Ignorada	2	.	.

Mortalidad por COVID19 Total, ajustada por edad y sexo, segú n región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	16.825	86,5	54,1
De Arica y Parinacota	228	90,4	60,7
De Tarapacá	293	76,5	67,2
De Antofagasta	587	84,8	78,1
De Atacama	115	36,5	24,7
De Coquimbo	303	36,2	21,4
De Valparaíso	1.260	64,3	33,8
Metropolitana de Santiago	10.875	133,8	91,1
Del Libertador B. O'Higgins	596	60,1	34,6
Del Maule	574	50,7	29,1
De Ñuble	223	43,6	21,3
Del Biobío	825	49,6	29,2
De La Araucanía	320	31,5	17,3
De Los Ríos	102	25,1	14,0
De Los Lagos	275	30,8	18,5
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	16	14,9	10,6
De Magallanes y de La Antártica Chilena	233	130,6	77,0
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	12.222	62,1	38,7
De Arica y Parinacota	211	82,6	56,0
De Tarapacá	375	95,9	83,9
De Antofagasta	452	64,2	58,1
De Atacama	118	37,3	25,4
De Coquimbo	387	45,6	25,9
De Valparaíso	1.306	66,0	35,9
Metropolitana de Santiago	4.479	54,3	36,9
Del Libertador B. O'Higgins	557	55,6	32,3
Del Maule	789	69,0	39,6
De Ñuble	279	54,2	26,2
Del Biobío	1.244	74,5	43,7
De La Araucanía	731	71,7	39,8
De Los Ríos	339	83,1	44,7
De Los Lagos	765	85,3	50,6
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	19	17,6	13,5
De Magallanes y de La Antártica Chilena	171	95,0	56,7
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	29.047	148,4	92,5
De Arica y Parinacota	439	173,0	116,5
De Tarapacá	668	172,6	151,4
De Antofagasta	1.039	148,9	135,9
De Atacama	233	73,8	50,0
De Coquimbo	690	81,9	47,4
De Valparaíso	2.566	130,3	69,7
Metropolitana de Santiago	15.354	187,6	127,0
Del Libertador B. O'Higgins	1.153	115,8	66,8
Del Maule	1.363	119,8	68,8
De Ñuble	502	97,9	47,6
Del Biobío	2.069	124,1	73,0
De La Araucanía	1.051	103,3	57,4
De Los Ríos	441	108,4	59,1
De Los Lagos	1.040	116,3	69,7
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	35	32,6	24,1
De Magallanes y de La Antártica Chilena	404	225,5	133,4
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	5.388	27,7	17,3
De Arica y Parinacota	60	23,8	16,3
De Tarapacá	58	15,2	13,3
De Antofagasta	194	28,0	25,7
De Atacama	35	11,1	7,6
De Coquimbo	122	14,6	8,6
De Valparaíso	585	29,8	15,6
Metropolitana de Santiago	3.052	37,6	25,5
Del Libertador B. O'Higgins	288	29,1	16,5
Del Maule	202	17,8	10,0
De Ñuble	67	13,1	6,7
Del Biobío	221	13,3	8,0
De La Araucanía	226	22,3	12,1
De Los Ríos	45	11,1	5,9
De Los Lagos	157	17,6	11,1
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	7	6,5	4,1
De Magallanes y de La Antártica Chilena	68	38,1	23,9
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	2.809	14,3	8,8
De Arica y Parinacota	50	19,6	12,6
De Tarapacá	37	9,5	8,3
De Antofagasta	57	8,1	7,5
De Atacama	36	11,4	7,7
De Coquimbo	107	12,6	7,1
De Valparaíso	320	16,2	8,3
Metropolitana de Santiago	1.179	14,3	9,7
Del Libertador B. O'Higgins	144	14,4	8,0
Del Maule	162	14,2	8,2
De Ñuble	65	12,6	6,2
Del Biobío	253	15,1	8,8
De La Araucanía	161	15,8	9,0
De Los Ríos	69	16,9	8,6
De Los Lagos	134	14,9	8,9
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	12	11,1	7,2
De Magallanes y de La Antártica Chilena	22	12,2	6,7
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	8.197	41,9	25,9
De Arica y Parinacota	110	43,4	28,8
De Tarapacá	95	24,5	21,5
De Antofagasta	251	36,0	32,9
De Atacama	71	22,5	15,3
De Coquimbo	229	27,2	15,6
De Valparaíso	905	45,9	23,8
Metropolitana de Santiago	4.231	51,7	34,8
Del Libertador B. O'Higgins	432	43,4	24,3
Del Maule	364	32,0	18,2
De Ñuble	132	25,7	12,8
Del Biobío	474	28,4	16,8
De La Araucanía	387	38,1	21,0
De Los Ríos	114	28,0	14,5
De Los Lagos	291	32,5	19,9
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	19	17,7	11,3
De Magallanes y de La Antártica Chilena	90	50,2	30,5
Ignorada	2	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 en las últimas dos semanas en Chile

Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Total en las últimas 2 semanas (Comunas con 5 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Tiltil	Metropolitana de Santiago	21,14	6	27,54
Mariquina	De Los Ríos	18,81	7	29,84
San Ramón	Metropolitana de Santiago	15,74	23	26,74
Huechuraba	Metropolitana de Santiago	15,63	22	19,22
Panguipulli	De Los Ríos	12,76	6	16,63
Renca	Metropolitana de Santiago	12,60	26	16,05
La Pintana	Metropolitana de Santiago	12,53	28	14,78
Ancud	De Los Lagos	12,52	9	21,18
Pedro Aguirre Ce...	Metropolitana de Santiago	12,02	24	22,34
Nueva Imperial	De La Araucanía	11,68	7	20,65



Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Total por Región de Residencia, últimas dos semanas



Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Confirmado en las últimas 2 semanas (Comunas con 5 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Mariquina	De Los Ríos	15,15	5	21,31
Ancud	De Los Lagos	12,52	9	21,18
San Ramón	Metropolitana de Santiago	11,75	17	19,76
Renca	Metropolitana de Santiago	10,82	22	13,58
Freire	De La Araucanía	9,41	5	19,63
Calama	De Antofagasta	8,89	19	9,83
Lo Espejo	Metropolitana de Santiago	8,68	16	15,48
Nueva Imperial	De La Araucanía	8,67	5	14,75
Mulchén	Del Biobío	8,40	5	16,09
El Monte	Metropolitana de Santiago	8,34	5	12,31

Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Confirmado por Región de Residencia, últimas dos semanas



Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Sospechoso en las últimas 2 semanas (Comunas con 3 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Huechuraba	Metropolitana de Santiago	8,09	11	9,61
Pedro Aguirre Ce...	Metropolitana de Santiago	6,21	12	11,17
Padre Las Casas	De La Araucanía	5,88	7	8,43
Curacaví	Metropolitana de Santiago	5,68	3	8,11
Teno	Del Maule	5,39	3	9,64
La Pintana	Metropolitana de Santiago	5,20	11	5,81
Pitrufquén	De La Araucanía	4,49	3	11,43
Melipilla	Metropolitana de Santiago	4,08	9	6,26
San Ramón	Metropolitana de Santiago	3,99	6	6,98
San Felipe	De Valparaíso	3,94	6	7,11



Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Sospechoso por Región de Residencia, últimas dos semanas



Notas técnicas y aclaratorias:

Datos y tablero dinámico se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Estadísticas e Información de Salud – DEIS http://deis.minsal.cl

El numeral utilizado, presenta separador de miles con "coma".

Bibliografía

Organización Panamericana de la Salud. (2018). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud CIE-10.

Unidas, N. (revisión 3, 2014). Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales. Nueva York.

Salud, O. P. (2020). Orientación Internacional para la Certificación y Clasificación (Codificación) del COVID-19 Como Causa de Muerte.

DEIS
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile