DEIS
Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

INFORME SEMANAL DE DEFUNCIONES POR COVID19 N°52

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
Ministerio de Salud

10 de junio de 2021

Resumen Ejecutivo

Este informe entrega información actualizada de las Defunciones ocurridas en Chile, en base a datos disponibles hasta el jueves, 10 de junio de 2021 18:20:33

Total de defunciones acumuladas **186.829.** Para el año 2020 **125.834** y para el año 2021 **60.995**
Total de defunciones por Covid-19 acumuladas **39.399** . Año 2020 **22.216**; año 2021 **17.183**
Total de defunciones por Covid-19 Confirmado acumuladas **30.579 .** Año 2020 **16.824 ;** año 2021 **13.755**
Total de defunciones por Covid-19 Sospechoso acumuladas **8.820**. Año 2020 **5.392** ; año 2021 **3.428**

Las defunciones acumuladas ocurridas entre marzo 2020 y enero 2021 por Covid-19, Confirmado y Sospechoso, representan el **21,09%** del total de defunciones del país, de acuerdo a las observaciones y recomendaciones de la OMS/OPS para la codificación de las defunciones producto del Covid-19.

En las últimas dos semanas se ha registrado un total de **1901** defunciones por Covid-19 Total, con una tasa ajustada del **6,1** por 100.000 habitantes a nivel país.

Índice

Tabla de contenido	Página
Introducción	2
Proceso de Codificación de la Causa Básica de Defunción (CBD)	2
Proceso Búsqueda Intencionada de Defunciones por Covid19	3
Distribución de defunciones por todas las causas. Comparación de los últimos 5 años	7
Análisis de exceso de mortalidad por grupos etarios, según mes de defunción (tasa por cien mil habitantes)	8
Principales causas de muerte en Chile, año 2020	10
Perfil etario y sexo de los fallecidos por Covid19	13
Lugar de defunción de los fallecidos por Covid19 y otras causas	14
Resultados Defunciones y Mortalidad por Covid19	15
Simulación perfil de fallecidos por Covid19, cuando no se considera Covid19 como Causa de Muerte	18
Defunciones y Mortalidad por Covid19 en las últimas dos semanas en Chile	20
Notas técnicas y aclaratorias	23
Bibliografía	23

Introducción

El Sistema de Estadísticas Vitales en Chile es continuo, obligatorio y centralizado. Se encuentra organizado bajo el marco de un acuerdo interinstitucional respaldado por un convenio tripartito que data del año 1982, actualizado con el Decreto N°68 del año 2012 y la ADENDA del 2018. Conformado por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Salud a través del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Proceso Codificación de la Causa Básica de Defunción (CBD)

El proceso comienza cuando una persona fallece y se debe generar el Certificado Médico de Defunción (CMD), siendo un formulario oficial, impreso y distribuido a los establecimientos de salud por el SRCeI, instrumento público que contiene datos sensibles, sujeto a las disposiciones legales que regulan tal información.

La base de datos de defunciones, se construye con los CMD, los cuales son sometida a un riguroso proceso de validación, para garantizar la confiablidad y la validez de la información.

Periódicamente, el SRCeI envía al DEIS los Certificados Médicos de Defunción inscritos y transcritos en formato electrónico. Estos son procesados por el DEIS en primera instancia para estandarizar los términos clínicos y homologarlos para su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10). Luego, se aplican las reglas de clasificación establecidas en la CIE10 que permiten determinar la causa básica y causa múltiples de la defunción.

Producto de la pandemia, el DEIS ha implementado desde marzo todas las observaciones y recomendaciones de la OMS/OPS para la codificación de defunciones producto del Covid19. Es así como se incorporaron los nuevos códigos para su codificación:

U07.1 COVID-19, virus identificado
- Caso confirmado con resultado positivo de la prueba.

U07.2 COVID-19, virus no identificado
- Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19
- Caso probable de COVID-19
- Caso sospechoso de COVID-19

Proceso Búsqueda Intencionada de Defunciones por Covid19

Con el inicio de la pandemia el Departamento de Estadísticas e Información de Salud implementó un plan de búsqueda intencionada de defunciones por Covid19. El plan en proceso de mejora continua estableció:

a) Dar prioridad a la codificación de todas las defunciones atribuibles a causas respiratorias o Covid19.

b) Identificar y establecer las fuentes externas. Es así como desde marzo se gestionó el acceso a las bases de datos de Epivigila, Unidad de Gestión de Camas Críticas - UGCC. Esta última para validar ciertas situaciones especiales.

c) Fomentar la realización del curso Curso Correcto llenado del Certificado Médico de Defunción

d) Implementación de procesos de seguimiento, validación y recodificación para todas las defunciones de casos Covid19 - Sospechosos, Causas Respiratorias u Otras Causas, que posteriormente contaron con la confirmación de un examen PCR. En términos generales, las principales reglas son:

Codificación de causa básica solo con Certificado Médico de Defunción		Mejora especificidad de las defunciones al utilizar fuente externa
Covid19 – Sospechoso o probable	->	"Covid19 – Confirmado" al disponer de un PCR Positivo
Covid19 – Confirmada	->	"Covid19 – Sospechoso o probable", al disponer de un PCR Negativo
Enfermedad Respiratoria	->	"Covid19 – Confirmado" al disponer de un PCR Positivo
Alguna enfermedad respiratoria u otras causas (se excluyen causas externas o materna)	->	"Covid19 – Sospechoso" al estar catalogado como caso "Probable" en Epivigila

"El uso de fuentes externas y una posible recodificación mejoran la especificidad de la causa de defunción"

La información que entrega la **base de consolidación de Laboratorios** , ayuda a precisar y confirmar lo consignado por el médico en el CMD, esto debido a que no todos especifican el Covid19 como causa de muerte, así como también existen certificados que tienen la causa Covid19 consignada, pero no cuentan con un examen PCR confirmatorio.

La información que entrega la **base de Epivigila** , aporta entre otras cosas, con la identificación de casos a los cuales no se les ha realizado examen de PCR, pero que se han notificado como un caso probable.

Dado este proceso, se puede identificar que al recepcionar el CMD se obtiene que, del total de defunciones, el 1% consigna en su certificado Covid19 Confirmado, el 13% menciona una posible causa por Covid19 y el 9% con alguna causa respiratoria.

Posterior a esta etapa inicial de codificación, validación y especificación con las fuentes de datos anteriormente señaladas, las defunciones por Covid19 confirmado se elevan al 16% del total de muertes del país, las defunciones por sospecha de Covid19 disminuyen al 5% al igual que las causas respiratorias (8%).

Codificación Inicial



Codificación Final



La codificación de la causa básica de defunción del grupo Covid19 (Sospechoso o Confirmado) varía conforme se actualice el estado clínico (Confirmado, Sospechoso o Descartado) en Epivigila o bien el resultado del examen de Laboratorio (Positivo, Negativo o No concluyente). Es importante recalcar que la fuente oficial, que confirma un Covid19 es el resultado de Laboratorio.

El 68,9% de la pesquisa de defunciones por sospecha de Covid19, proviene del CMD informado con Covid19, pero con PCR Negativo, no concluyente o sin registro de examen realizado en Laboratorio. El 31,1% restante, son pesquisados sin identificación de Covid19 en el CMD, pero que presentan un examen de laboratorio no concluyente, sin resultado o bien sin registro en laboratorio, pero presente en la base de Epivigila con registro de etapa clínica Confirmada, Sospechosa o Probable.

Para los casos confirmados, la pesquisa sin CMD equivale al 23,0% ; el 77,0% restante viene con información en el documento oficial.

El proceso completo y la reclasificación de la causa básica de defunción basado en el proceso BIRD COVID-19, se ve reflejada en el gráfico a continuación. En donde cada etapa del proceso se visualiza de arriba hacia abajo. Cada color mantiene la trayectoria de la codificación inicial a la final, viendose afectada por el cruce de las fuentes de datos de Laboratorio y Epivigila. Esta representación gráfica, resume el movimiento de codificaciones durante la última semana. Las etapas del proceso, están representadas a la derecha del gráfico.

Resultado tras aplicar el proceso de búsqueda intencionada y reclasificación de defunciones por COVID-19



La aplicación de la metodología BIRD COVID-19, genera un movimiento en la codificación de la causa básica de muerte, ya que depende de la confirmación o descarte de PCR dada por laboratorio.

La reclasificación de la causa de defunción posterior al proceso BIRD de la última semana analizada se puede analizar en la tabla a continuación. En donde se observa que 1030 fueron reclasificados y distribuídos en distintas casuas de defunción.

Tabla resumen codificación inicial (CMD) y codificación final (CBD)

CBD ▲	Total	Causas Externas y Causas Maternas	COVID Confirmado	COVID Sospechoso	Respiratorias
CMD ▲	casos	casos	casos	casos	casos
Total	**1030**	**67**	**589**	**238**	**136**
Causas Externas y Causas Maternas	**65**	65	—	—	—
COVID Confirmado	**37**	—	28	9	—
COVID Sospechoso	**479**	—	385	94	—
Otras	**253**	2	144	106	1
Respiratorias	**196**	—	32	29	135

Distribución de defunciones por todas las causas. Comparación mortalidad promedio por mes años 2016-2019, en relación a años 2020 y 2021

Comparación mortalidad promedio 2016-2019 y mortalidad 2020 y mortalidad 2021, según mes de defunción. Todas las causas



Al realizar una comparación de las defunciones registradas e informadas en los últimos 6 años en Chile (2016-2021), agrupando el cuatrienio 2016-2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en todos los meses analizados.

Defunciones por mes y año

. ▲	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Año defunción ▼	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**	**Defunciones**
2021	**61.015**	11.194	10.238	11.841	11.961	12.633	3.148	—	—	—	—	—
2020	**125.942**	9.053	7.944	8.701	8.896	12.003	16.082	12.594	11.081	10.211	10.320	9.371
2019	**109.680**	8.420	7.774	8.172	8.531	9.796	10.391	10.648	9.940	9.524	9.272	8.576
2018	**106.820**	8.136	7.373	8.221	8.212	8.887	9.983	10.519	10.500	9.262	8.922	8.359
2017	**106.448**	8.705	7.437	7.773	8.185	9.121	10.828	10.496	9.700	9.289	8.735	8.074
2016	**104.062**	8.402	7.444	7.810	8.123	8.748	9.443	10.734	9.697	9.245	8.557	7.982

Análisis de exceso de mortalidad por grupos etarios, según mes de defunción (tasa por cien mil habitantes)

Comparación 0 a 29 años



Grupo_etario ▲	0 a 29	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-4%	-15%
Febrero	-5%	-6%
Marzo	-9%	0%
Abril	-15%	-13%
Mayo	-4%	-10%
Junio	-5%	-82%
Julio	-16%	.
Agosto	-24%	.
Septiembre	-13%	.
Octubre	-9%	.
Noviembre	-14%	.

Comparación 30 a 49 años



Grupo_etario ▲	30 a 49	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-9%	6%
Febrero	-8%	14%
Marzo	0%	31%
Abril	-2%	28%
Mayo	24%	40%
Junio	37%	-68%
Julio	15%	.
Agosto	1%	.
Septiembre	2%	.
Octubre	15%	.
Noviembre	-1%	.
Diciembre	-1%	.

Comparación 50 a 59 años



Grupo_etario ▲	50 a 59	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-2%	23%
Febrero	2%	24%
Marzo	-1%	37%
Abril	7%	64%
Mayo	28%	57%
Junio	57%	-70%
Julio	18%	.
Agosto	16%	.
Septiembre	7%	.
Octubre	19%	.
Noviembre	7%	.
Diciembre	9%	.

El cálculo de la variación porcentual se realiza en base a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019. Los valores negativos, indican que en el mes observado, las defunciones son menores a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019; mientras que, un valor positivo indica el porcentaje de sobremortalidad.

Comparación 60 a 69 años



Grupo_etario ▲	60 a 69	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-0%	25%
Febrero	-3%	27%
Marzo	5%	44%
Abril	-3%	42%
Mayo	27%	32%
Junio	70%	-72%
Julio	22%	.
Agosto	7%	.
Septiembre	3%	.
Octubre	13%	.
Noviembre	9%	.
Diciembre	13%	.

Comparación 70 a 79 años



Grupo_etario ▲	70 a 79	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-3%	23%
Febrero	-3%	21%
Marzo	-4%	31%
Abril	-1%	29%
Mayo	27%	19%
Junio	57%	-71%
Julio	14%	.
Agosto	6%	.
Septiembre	2%	.
Octubre	7%	.
Noviembre	8%	.
Diciembre	12%	.

Comparación 80 y más años



Grupo_etario ▲	80 +	
Mes ▲	Variación 2020	Variación 2021
Enero	-5%	10%
Febrero	-9%	15%
Marzo	-5%	21%
Abril	-7%	12%
Mayo	7%	7%
Junio	24%	-76%
Julio	-5%	.
Agosto	-8%	.
Septiembre	-8%	.
Octubre	-4%	.
Noviembre	-4%	.
Diciembre	0%	.

El cálculo de la variación porcentual se realiza en base a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019. Los valores negativos, indican que en el mes observado, las defunciones son menores a la mortalidad promedio de los años 2016 a 2019; mientras que, un valor positivo indica el porcentaje de sobremortalidad.

Principales causas de muerte en Chile, años 2020 y 2021

Una Clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de datos de morbilidad y mortalidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes épocas. (Vol 02, CIE 10)
Los capítulos de la CIE10 agrupan causas asociadas que van generando mayor especificidad a la clasificación. Es importante considerar que existen criterios para la elaboración de las listas de principales causas de muerte siendo los más importantes su relación con la CIE-10, criterios epidemiológicos, importancia en salud pública y el uso específico de la lista. En este caso, se utiliza la agrupación de capítulo para el gráfico de torta; para el caso del ranking de las principales causas, se utiliza la lista 6/67 de OPS.
(https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9176:2013-listas-especiales-tabulacion-mortalidad&Itemid=40350&lang=es)

Distribución Causa Básica de Defunción por Capítulos CIE-10



Primeras 10 causas de muerte en Chile según frecuencia de defunciones



De acuerdo al comportamiento de la pandemia, se hace indispensable conocer la distribución de causas según tipo de COVID19 (Confirmado y Sospechoso). El gráfico siguiente, muestra como en los ú ltimos días informados, la causa de muerte por Covid19 Sospechoso es igual o mayor a Covid19 Confirmado. Este comportamiento se invierte con el correr de los días y la actualización de los registros de casos sospechosos a confirmados o de sospechoso a caso descartado en base a las fuentes externas (Laboratorio y Epivigila) que aportan en la reclasificación de los casos.

Defunciones por COVID19 (Sospechoso y Confirmado)



El proceso de Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Defunciones por COVID19, permite identificar y reclasificar la causa básica de defunción de acuerdo a la actualización de las fuentes utilizadas en el proceso; tal es el caso de Laboratorio y Epivigila (ambas administradas por el Departamento de Epidemiología de este Ministerio de Salud), fuentes externas al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, que entregan información de gran valor para la especificidad de la causa que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la persona a la muerte.

Total de fallecimientos por COVID19 Total según fecha de defunción y nuevas cargas



Total de fallecimientos por COVID19 Confirmado según fecha de defunción y nuevas cargas



Total de fallecimientos por COVID19 Sospechoso según fecha de defunción y nuevas cargas



Perfil etario y sexo de los fallecidos por COVID19 acumulado años 2020 y 2021

Distribución etaria según tipo de COVID19



Distribución según sexo de COVID19 Confirmado



Distribución según sexo de COVID19 Sospechoso



Distribución de defunciones por COVID19 Confirmado, según edad y sexo



Distribución de defunciones por COVID19 Sospechoso, según edad y sexo



Lugar de defunción de los fallecidos por COVID19 y otras causas acumulado años 2020 y 2021

Defunciones por COVID19 según lugar de defunción y otras causas de muerte



Defunciones por COVID19 según edad y lugar de defunción



Hombres



Mujeres



Resultados Defunciones y Mortalidad por COVID19 según año

El total de defunciones y la mortalidad por Covid19 (Sospechoso y Confirmado) por región de residencia se presenta por **Tasas Observadas por cien mil habitantes con Población INE, Censo 2017** ; y **Tasas ajustadas por edad y sexo por cada cien mil habitantes con Población Estándar INE, Censo 2002** .

Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	22.216	114,2	71,3
De Arica y Parinacota	288	114,2	77,0
De Tarapacá	351	91,7	80,5
De Antofagasta	781	112,9	103,8
De Atacama	150	47,7	32,3
De Coquimbo	425	50,8	29,9
De Valparaíso	1.845	94,1	49,4
Metropolitana de Santiago	13.929	171,4	116,5
Del Libertador B. O'Higgins	884	89,2	51,1
Del Maule	776	68,6	39,1
De Ñuble	291	56,9	28,1
Del Biobío	1.046	62,9	37,1
De La Araucanía	546	53,8	29,4
De Los Ríos	147	36,2	19,9
De Los Lagos	432	48,5	29,6
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	23	21,4	14,7
De Magallanes y de La Antártica Chilena	301	168,8	100,9
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID Total, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	17.183	87,3	54,5
De Arica y Parinacota	295	115,5	77,2
De Tarapacá	445	113,8	99,7
De Antofagasta	547	77,7	70,4
De Atacama	174	54,9	37,9
De Coquimbo	562	66,3	37,7
De Valparaíso	1.849	93,4	50,4
Metropolitana de Santiago	6.667	80,9	55,0
Del Libertador B. O'Higgins	816	81,5	46,9
Del Maule	1.038	90,8	52,5
De Ñuble	388	75,4	36,8
Del Biobío	1.671	100,0	58,6
De La Araucanía	1.006	98,7	55,1
De Los Ríos	469	115,0	61,7
De Los Lagos	995	110,9	66,1
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	43	39,9	27,9
De Magallanes y de La Antártica Chilena	217	120,6	71,9
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Total, ajustada por edad y sexo, segú n región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Total según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	39.399	201,3	125,4
De Arica y Parinacota	583	229,8	154,1
De Tarapacá	796	205,7	180,5
De Antofagasta	1.328	190,3	173,6
De Atacama	324	102,6	70,2
De Coquimbo	987	117,2	67,7
De Valparaíso	3.694	187,5	99,7
Metropolitana de Santiago	20.596	251,7	170,4
Del Libertador B. O'Higgins	1.700	170,7	97,9
Del Maule	1.814	159,5	91,8
De Ñuble	679	132,4	65,0
Del Biobío	2.717	163,0	96,0
De La Araucanía	1.552	152,6	84,9
De Los Ríos	616	151,4	82,2
De Los Lagos	1.427	159,6	96,3
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	66	61,4	42,7
De Magallanes y de La Antártica Chilena	518	289,1	172,5
Ignorada	2	.	.

Mortalidad por COVID19 Total, ajustada por edad y sexo, segú n región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	16.824	86,5	54,1
De Arica y Parinacota	228	90,4	60,7
De Tarapacá	293	76,5	67,2
De Antofagasta	587	84,8	78,1
De Atacama	115	36,5	24,7
De Coquimbo	303	36,2	21,4
De Valparaíso	1.260	64,3	33,8
Metropolitana de Santiago	10.874	133,8	91,1
Del Libertador B. O'Higgins	596	60,1	34,6
Del Maule	574	50,7	29,1
De Ñuble	223	43,6	21,3
Del Biobío	825	49,6	29,2
De La Araucanía	320	31,5	17,3
De Los Ríos	102	25,1	14,0
De Los Lagos	275	30,8	18,5
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	16	14,9	10,6
De Magallanes y de La Antártica Chilena	233	130,6	77,0
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	13.755	69,9	43,7
De Arica y Parinacota	234	91,6	61,9
De Tarapacá	407	104,0	91,1
De Antofagasta	487	69,2	62,6
De Atacama	136	42,9	29,7
De Coquimbo	442	52,1	29,8
De Valparaíso	1.472	74,4	40,6
Metropolitana de Santiago	5.162	62,6	42,5
Del Libertador B. O'Higgins	642	64,1	37,2
Del Maule	849	74,3	42,7
De Ñuble	311	60,4	29,4
Del Biobío	1.366	81,8	48,1
De La Araucanía	812	79,6	44,3
De Los Ríos	379	92,9	50,4
De Los Lagos	833	92,8	55,4
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	30	27,8	20,1
De Magallanes y de La Antártica Chilena	193	107,3	64,6
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Confirmado según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	30.579	156,3	97,5
De Arica y Parinacota	462	182,1	122,5
De Tarapacá	700	180,9	158,8
De Antofagasta	1.074	153,9	140,4
De Atacama	251	79,5	54,4
De Coquimbo	745	88,5	51,3
De Valparaíso	2.732	138,7	74,4
Metropolitana de Santiago	16.036	195,9	132,7
Del Libertador B. O'Higgins	1.238	124,3	71,8
Del Maule	1.423	125,1	72,0
De Ñuble	534	104,1	50,9
Del Biobío	2.191	131,4	77,5
De La Araucanía	1.132	111,3	62,0
De Los Ríos	481	118,2	64,9
De Los Lagos	1.108	123,9	74,6
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	46	42,8	30,8
De Magallanes y de La Antártica Chilena	426	237,8	141,4
Ignorada	.	.	.

Mortalidad por COVID19 Confirmado, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos año 2020

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	5.392	27,7	17,3
De Arica y Parinacota	60	23,8	16,3
De Tarapacá	58	15,2	13,3
De Antofagasta	194	28,0	25,7
De Atacama	35	11,1	7,6
De Coquimbo	122	14,6	8,6
De Valparaíso	585	29,8	15,6
Metropolitana de Santiago	3.055	37,6	25,5
Del Libertador B. O'Higgins	288	29,1	16,5
Del Maule	202	17,8	10,0
De Ñuble	68	13,3	6,8
Del Biobío	221	13,3	8,0
De La Araucanía	226	22,3	12,1
De Los Ríos	45	11,1	5,9
De Los Lagos	157	17,6	11,1
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	7	6,5	4,1
De Magallanes y de La Antártica Chilena	68	38,1	23,9
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2020



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos año 2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	3.428	17,4	10,8
De Arica y Parinacota	61	23,9	15,3
De Tarapacá	38	9,7	8,5
De Antofagasta	60	8,5	7,8
De Atacama	38	12,0	8,2
De Coquimbo	120	14,1	7,9
De Valparaíso	377	19,0	9,8
Metropolitana de Santiago	1.505	18,3	12,4
Del Libertador B. O'Higgins	174	17,4	9,7
Del Maule	189	16,5	9,8
De Ñuble	77	15,0	7,3
Del Biobío	305	18,3	10,5
De La Araucanía	194	19,0	10,9
De Los Ríos	90	22,1	11,3
De Los Lagos	162	18,1	10,7
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	13	12,1	7,8
De Magallanes y de La Antártica Chilena	24	13,3	7,3
Ignorada	1	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos año 2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 Sospechoso según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021

Nombre Región ▲	Defunciones	Tasa observada	Tasa ajustada
País	8.820	45,1	27,9
De Arica y Parinacota	121	47,7	31,6
De Tarapacá	96	24,8	21,7
De Antofagasta	254	36,4	33,2
De Atacama	73	23,1	15,8
De Coquimbo	242	28,7	16,5
De Valparaíso	962	48,8	25,3
Metropolitana de Santiago	4.560	55,7	37,7
Del Libertador B. O'Higgins	462	46,4	26,1
Del Maule	391	34,4	19,8
De Ñuble	145	28,3	14,1
Del Biobío	526	31,6	18,5
De La Araucanía	420	41,3	22,9
De Los Ríos	135	33,2	17,3
De Los Lagos	319	35,7	21,7
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo	20	18,6	11,9
De Magallanes y de La Antártica Chilena	92	51,4	31,1
Ignorada	2	.	.

Mortalidad por COVID19 Sospechoso, ajustada por edad y sexo, según región de residencia. Ambos sexos años 2020-2021



Defunciones y Mortalidad por COVID19 en las últimas dos semanas en Chile

Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Total en las últimas 2 semanas (Comunas con 5 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Ercilla	De La Araucanía	26,66	5	59,20
Mariquina	De Los Ríos	15,95	5	21,31
San Joaquín	Metropolitana de Santiago	15,88	29	27,92
Cerro Navia	Metropolitana de Santiago	15,17	32	22,49
San Ramón	Metropolitana de Santiago	14,63	25	29,06
Santa María	De Valparaíso	14,55	5	30,23
Cañete	Del Biobío	13,97	9	24,23
La Pintana	Metropolitana de Santiago	13,96	31	16,36
Los Andes	De Valparaíso	13,07	16	23,39
Llaillay	De Valparaíso	12,97	6	22,42



Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Total por Región de Residencia, últimas dos semanas



Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Confirmado en las últimas 2 semanas (Comunas con 5 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Cañete	Del Biobío	12,97	8	21,54
Mulchén	Del Biobío	12,82	6	19,31
San Ramón	Metropolitana de Santiago	11,45	19	22,09
Cerro Navia	Metropolitana de Santiago	11,31	24	16,87
Nacimiento	Del Biobío	11,26	5	17,87
Llaillay	De Valparaíso	11,13	5	18,68
Castro	De Los Lagos	10,99	7	14,60
Lampa	Metropolitana de Santiago	10,64	12	9,13
Lautaro	De La Araucanía	10,37	7	17,05
San Joaquín	Metropolitana de Santiago	10,32	18	17,33



Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Confirmado por Región de Residencia, últimas dos semanas



Comunas con mayor mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID19 Sospechoso en las últimas 2 semanas (Comunas con 3 o más defunciones)

Nombre comuna	Región de Residencia	Tasa ajustada ▼	Defunciones	Tasa observada
Futrono	De Los Ríos	10,56	3	19,67
Lebu	Del Biobío	6,60	3	11,06
San Felipe	De Valparaíso	5,84	8	9,47
Buin	Metropolitana de Santiago	5,66	8	7,15
Coihueco	De Ñuble	5,59	3	10,50
San Joaquín	Metropolitana de Santiago	5,57	11	10,59
Isla de Maipo	Metropolitana de Santiago	5,09	3	7,35
Quilicura	Metropolitana de Santiago	4,90	10	3,82
Peñaflor	Metropolitana de Santiago	4,84	7	6,82
Pedro Aguirre Ce...	Metropolitana de Santiago	4,84	10	9,31



Tasa ajustada por edad y sexo. Población estándar Censo 2002. Tasa observada por cien mil habitantes. Población Censo 2017

Tasa ajustada COVID19 Sospechoso por Región de Residencia, últimas dos semanas



Notas técnicas y aclaratorias:

Datos y tablero dinámico se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Estadísticas e Información de Salud – DEIS http://deis.minsal.cl

El numeral utilizado, presenta separador de miles con "coma".

Bibliografía

Organización Panamericana de la Salud. (2018). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud CIE-10.

Unidas, N. (revisión 3, 2014). Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales. Nueva York.

Salud, O. P. (2020). Orientación Internacional para la Certificación y Clasificación (Codificación) del COVID-19 Como Causa de Muerte.

DEIS
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile