

**Indicadores de referencia nacional de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) vigentes desde Mayo de 2014**  
**CIRC C13/09 de 4 Julio de 2014**

La información para obtener los indicadores de las IAAS proviene de 194 hospitales que ingresaron sus datos al sistema informático SICARS. Estos indicadores deberán ser usados por todos los hospitales, independiente de su tamaño o complejidad. Para estos efectos compararán sus tasas con los indicadores de referencia y si las tasas locales se encuentran sobre los de referencia, programarán, realizarán medidas de intervención y documentarán la realización e impacto de éstas.

Los indicadores de referencia de las IAAS se han fijado en el percentil 75 de la serie de hospitales que cumplen con el criterio de inclusión. El criterio de inclusión se ha fijado considerando un mínimo de exposición (250 días de procedimiento o 50 procedimientos según sea el caso) con el fin de minimizar el efecto de hospitales con tasas extremas por tener bajos números de expuestos. Si el dato más reciente de indicador es mayor que el observado en el período anterior, se ha mantenido el valor más bajo. Se crearon indicadores sólo en aquellas IAAS en que al menos 20 hospitales cumplieron el criterio de inclusión.

| Infecciones Respiratorias Inferiores (neumonía)   |                      |           |            |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|-----------|------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° neumonías en pacientes en ventilación mecánica (NVM) ÷ 1000 días de ventilación mecánica (VM) |                      |           |            |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de VM acumulados en 2013*                                  |                      |           |            |                |         |              |              |                         |
| Tipo de servicio  | Hospitales incluidos | N° de NVM | N° días VM | Indicador      |         |              |              | Indicador de referencia |
|   |                      |           |            | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 |                         |
| Adulto  | 43                   | 1.225     | 105.647    | 11,60          | 11,33   | 15,57        | 24,38        | <b>15,6</b>             |
| Pediátrico  | 24                   | 135       | 29.247     | 4,62           | 2,89    | 6,13         | 9,19         | <b>6,1</b>              |
| Neonatología  | 25                   | 98        | 20.198     | 4,85           | 3,09    | 6,34         | 14,32        | <b>6,3</b>              |

| Infecciones Intestinales  |                      |                             |                         |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° pacientes con diarrea ÷ 1000 días de hospitalización                      |                      |                             |                         |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de hospitalización acumulados en 2013* |                      |                             |                         |                |         |              |              |                         |
| Tipo de servicio  | Hospitales incluidos | N° de pacientes con diarrea | N° días hospitalización | Indicador      |         |              |              | Indicador de referencia |
|   |                      |                             |                         | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 |                         |
| Lactantes   | 83                   | 512                         | 302.330                 | 1,69           | 0,71    | 1,66         | 4,73         | <b>1,7</b>              |
| Neonatología  | 49                   | 12                          | 107.658                 | 0,11           | 0,00    | 0,00         | 0,55         | <b>0,01</b>             |

| Infecciones Respiratorias Agudas Virales   |                      |                          |                         |                |         |              |              |                         |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° pacientes con infección respiratoria aguda viral (IRAV) ÷ 1000 días de hospitalización |                      |                          |                         |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de hospitalización acumulados en 2013*              |                      |                          |                         |                |         |              |              |                         |
| Tipo de servicio   | Hospitales incluidos | N° de pacientes con IRAV | N° días hospitalización | Indicador      |         |              |              | Indicador de referencia |
|  |                      |                          |                         | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 |                         |
| Lactantes  | 85                   | 466                      | 294.808                 | 1,58           | 0,33    | 1,38         | 3,96         | <b>1,4</b>              |

| Infecciones del Torrente Sanguíneo (bacteremia/septicemia)  |                      |           |                       |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° infecciones del torrente sanguíneo (ITS) ÷ 1000 días de exposición al procedimiento |                      |           |                       |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de exposición acumulados en 2013*                |                      |           |                       |                |         |              |              |                         |
| Procedimiento   | Hospitales incluidos | N° de ITS | N° días procedimiento | Indicador      |         |              |              |                         |
|   |                      |           |                       | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 | Indicador de referencia |
| Catéteres venosos centrales en adultos  | 54                   | 526       | 233.972               | 2,25           | 2,11    | 2,94         | 5,11         | <b>2,9</b>              |
| Catéteres venosos centrales en niños  | 24                   | 131       | 47.053                | 2,78           | 1,69    | 3,54         | 5,32         | <b>2,6</b>              |
| Nutrición parenteral total en adultos   | 28                   | 30        | 23.288                | 1,29           | 0,00    | 2,72         | 6,50         | <b>2,2</b>              |
| Nutrición parenteral total en niños   | 22                   | 49        | 30.012                | 1,63           | 1,51    | 4,11         | 9,93         | <b>2,3</b>              |
| Catéteres umbilicales en neonatos   | 20                   | 25        | 10.513                | 2,38           | 1,75    | 4,13         | 8,23         | <b>3,2</b>              |
| Catéteres centrales hemodiálisis  | 36                   | 155       | 221.708               | 0,70           | 0,66    | 1,35         | 3,78         | <b>1,4</b>              |

| Infecciones del Tracto Urinario   |                      |           |             |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|-----------|-------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° infecciones del tracto urinario (ITU) en pacientes con catéter urinario permanente (CUP) ÷ 1000 días de CUP |                      |           |             |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de CUP acumulados en 2013*   |                      |           |             |                |         |              |              |                         |
| Tipo de servicio  | Hospitales incluidos | N° de ITU | N° días CUP | Indicador      |         |              |              |                         |
|   |                      |           |             | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 | Indicador de referencia |
| Medicina  | 104                  | 879       | 172.366     | 5,10           | 3,50    | 6,28         | 12,36        | <b>6,2</b>              |
| Cirugía   | 54                   | 323       | 83.193      | 3,88           | 3,11    | 6,25         | 10,77        | <b>5,3</b>              |
| U.C.I.  | 52                   | 1.024     | 203.107     | 5,04           | 4,22    | 6,64         | 11,09        | <b>5,3</b>              |

| Infecciones de la Herida Operatoria   |                      |            |        |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|------------|--------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° infecciones de la herida operatoria (IHOp) ÷ 100 pacientes operados (ops) |                      |            |        |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 ops acumulados en 2013*                      |                      |            |        |                |         |              |              |                         |
| Tipo de operación   | Hospitales incluidos | N° de IHOp | N° ops | Indicador      |         |              |              | Indicador de referencia |
|   |                      |            |        | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 |                         |
| Hernias inguinales adultos  | 54                   | 33         | 7.375  | 0,45           | 0,00    | 0,71         | 1,31         | <b>0,4</b>              |
| Cesáreas  | 65                   | 445        | 58.140 | 0,77           | 0,62    | 1,03         | 1,74         | <b>0,9</b>              |
| Colecistectomía por laparotomía   | 34                   | 28         | 4.448  | 0,63           | 0,00    | 0,91         | 3,01         | <b>0,9</b>              |
| Colecistectomía por laparoscopia  | 68                   | 50         | 28.736 | 0,17           | 0,00    | 0,14         | 0,68         | <b>0,2</b>              |
| Prótesis de cadera  | 26                   | 71         | 3.907  | 1,82           | 1,13    | 2,61         | 6,31         | <b>2,0</b>              |

| Endometritis puerperal  |                      |          |           |                |         |              |              |                         |
|---|----------------------|----------|-----------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| Indicador: N° endometritis puerperales (EP) ÷ 100 partos              |                      |          |           |                |         |              |              |                         |
| Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 partos acumulados en 2013* |                      |          |           |                |         |              |              |                         |
| Tipo de parto   | Hospitales incluidos | N° de EP | N° partos | Indicador      |         |              |              | Indicador de referencia |
|   |                      |          |           | Tasa acumulada | Mediana | Percentil 75 | Percentil 95 |                         |
| Vaginal   | 77                   | 384      | 90.210    | 0,43           | 0,31    | 0,54         | 2,38         | <b>0,5</b>              |
| Cesárea con trabajo de parto  | 57                   | 128      | 28.210    | 0,45           | 0,27    | 0,65         | 2,43         | <b>0,4</b>              |
| Cesárea sin trabajo de parto  | 65                   | 57       | 30.036    | 0,19           | 0,00    | 0,26         | 0,90         | <b>0,1</b>              |

\*Fe de Erratas: En la Circ C13/09 de 4 de JUL d 2014 dice 2012 y debe decir 2013