

**Indicadores de referencia nacional de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) vigentes desde Mayo de 2013  
(Circular C13/14 de 7 de Mayo de 2013)**

La información para obtener los indicadores de las IAAS proviene de 161 hospitales que ingresaron sus datos al sistema informático SICARS. Estos indicadores deberán ser usados por todos los hospitales, independiente de su tamaño o complejidad. Para estos efectos compararán sus tasas con los indicadores de referencia y si las tasas locales se encuentran sobre los de referencia, programarán, realizarán medidas de intervención y documentarán la realización e impacto de éstas.

Los indicadores de referencia de las IAAS se han fijado en el percentil 75 de la serie de hospitales que cumplen con el criterio de inclusión. El criterio de inclusión se ha fijado considerando un mínimo de exposición (250 días de procedimiento ó 50 procedimientos) de acuerdo a cada indicador con el fin de minimizar el efecto de hospitales con tasas extremas por tener bajos números de expuestos. Si el dato más reciente de indicador es mayor que el observado en el período anterior, se ha mantenido el valor más bajo.

Infecciones Respiratorias Inferiores (neumonía)								
Indicador: N° neumonías en pacientes en ventilación mecánica (NVM) ÷ 1000 días de ventilación mecánica (VM)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de VM acumulados en 2012								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	N° de NVM	N° días VM	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Adulto	43	1.415	102.377	13,82	12,67	19,61	33,41	<b>19,6</b>
Pediátrico	24	167	29.368	5,69	4,69	6,67	21,83	<b>6,2</b>
Neonatología	24	132	21.116	6,25	3,94	9,42	23,46	<b>7,6</b>

Infecciones Intestinales								
Indicador: N° pacientes con diarrea ÷ 1000 días de hospitalización								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de hospitalización acumulados en 2012								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	N° de pacientes con diarrea	N° días hospitalización	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Lactantes	82	580	309.053	1,88	1,10	2,30	7,07	<b>2,3</b>
Neonatología	50	27	285.970	0,09	0,00	0,00	3,97	<b>0,01</b>

Infecciones del Torrente Sanguíneo (bacteremia/septicemia)								
Indicador: N° infecciones del torrente sanguíneo (ITS) ÷ 1000 días de exposición al procedimiento								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de exposición acumulados en 2012								
Procedimiento	Hospitales incluidos	N° de ITS	N° días procedimiento	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Catéteres venosos centrales en adultos	53	603	231.558	2,60	2,37	3,54	16,95	<b>2,9</b>
Catéteres venosos centrales en niños	26	197	57.677	3,42	1,53	2,65	6,31	<b>2,6</b>
Nutrición parenteral total en adultos	37	58	46.986	1,23	0,00	2,89	9,65	<b>2,2</b>
Nutrición parenteral total en niños	24	90	33.853	2,66	2,36	5,05	13,97	<b>2,3</b>
Catéteres umbilicales en neonatos	21	27	11.108	2,43	2,02	3,21	10,91	<b>3,2</b>
Catéteres centrales hemodiálisis	32	161	142.525	1,13	0,99	1,53	5,57	<b>1,5</b>

Infecciones del Tracto Urinario								
Indicador: N° infecciones del tracto urinario (ITU) en pacientes con catéter urinario permanente (CUP) ÷ 1000 días de CUP								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de CUP acumulados en 2012								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	N° de ITU	N° días CUP	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Medicina	90	852	164.122	5,19	3,87	6,27	17,79	<b>6,2</b>
Cirugía	67	313	103.235	3,03	2,90	5,67	20,94	<b>5,3</b>
U.C.I.	54	874	176.809	4,94	3,62	5,36	20,79	<b>5,3</b>

Infecciones de la Herida Operatoria								
Indicador: N° infecciones de la herida operatoria (IHOp) ÷ 100 pacientes operados (ops)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 ops acumulados en 2012								
Tipo de operación	Hospitales incluidos	N° de IHOp	N° ops	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Hernias inguinales adultos	46	46	6.598	0,70	0,00	0,90	5,56	<b>0,4</b>
Cesáreas	65	416	58.448	0,71	0,59	0,94	3,49	<b>0,9</b>
Colecistectomía por laparotomía	37	32	5.624	0,57	0,00	1,25	3,85	<b>0,9</b>
Colecistectomía por laparoscopia	64	58	26.757	0,22	0,00	0,22	2,97	<b>0,2</b>
Prótesis de cadera	24	80	4.145	1,93	0,96	2,05	10,66	<b>2,0</b>
By pass coronario	8	41	1.441	2,85	2,78	5,86	10,00	*

\* No se generó indicador pues el número de hospitales que aportó información es muy bajo

Endometritis puerperal								
Indicador: N° endometritis puerperales (EP) ÷ 100 partos								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 partos acumulados en 2012								
Tipo de parto	Hospitales incluidos	N° de EP	N° partos	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Vaginal	83	409	89.955	0,45	0,27	0,58	7,69	<b>0,5</b>
Cesárea con trabajo de parto	56	145	30.905	0,47	0,34	0,62	2,71	<b>0,4</b>
Cesárea sin trabajo de parto	62	33	27.571	0,12	0,00	0,18	1,69	<b>0,1</b>